

## Alteraciones de la función sexual en mujeres con cáncer de mama, en el Quindío, Colombia, 2016-2017

*Espitia-De La Hoz Franklin J; De León Ospina Daniel.* Hathor, Clínica Sexológica.

### INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama suele afectar la función sexual de la mujer, no solo por el componente orgánico sino por el impacto psicológico que involucra (1).

### Objetivo


Evaluar las alteraciones de la función sexual en las mujeres del Quindío que padecen cáncer de mama.

### Materiales y métodos

Estudio de corte transversal; en una muestra de 48 mujeres con diagnóstico de cáncer de mama; evaluadas mediante el instrumento Índice de Función Sexual Femenina (IFSF); entre 2016 y 2017. La población la constituyeron todas las mujeres tratadas por cáncer de mama, en el programa de Ginecología Oncológica, en la Clínica La Sagrada Familia, Armenia (Quindío), Colombia. Muestreo consecutivo no probabilístico por conveniencia. Investigación aprobada por el comité de ética de Hathor, Clínica Sexológica.

### Resultados

Edad promedio  $46.8 \pm 7.5$  años. El promedio del puntaje total del IFSF, en la población afectada, fue  $18,09 \pm 4,14$  puntos, para una prevalencia de trastornos sexuales del 54.16%. El 58.33% presentó, en simultánea, dos o más trastornos asociados (gráfica 1).



**Gráfica 1.** Prevalencia de trastornos sexuales en mujeres con cáncer de mama, en el Quindío.

### Conclusiones

Un significativo porcentaje de mujeres con cáncer de mama presentan algún grado de afectación de su función sexual, siendo el deseo y el orgasmo, los más afectados.

### Bibliografía

1) *Espitia De La Hoz, FJ. Prevalencia de trastornos sexuales en mujeres con cáncer ginecológico en el departamento del Quindío, Rev.cienc.biomed. 2016; 7(2):203-211*