

Incidencia de colitis ulcerativa en las mujeres colombianas

I. Maldonado^{1,2}, S. Castro³, N. Rodríguez¹, I. Rodas³, N. Ayala^{1,2}, D. Angulo³

¹Departamento de Ginecología y Obstetricia, Fundación Santa Fe de Bogotá, Bogotá, Colombia. ²Facultad de Medicina, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. ³Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.

INTRODUCCIÓN

La colitis ulcerativa es una patología gastrointestinal a partir de un componente inflamatorio¹. En Colombia se conocen pocos datos epidemiológicos de esta enfermedad.

OBJETIVO

Describir el comportamiento de la incidencia de la colitis ulcerativa en las mujeres colombianas entre 2012 a 2018.

MÉTODOS

Diseño: estudio observacional, descriptivo en mujeres colombianas entre 2012 y 2018

Fuentes de Información: RIPS y DANE

Criterios y validación: código CIE-10 y uso de CUPS para validar la incidencia de la enfermedad a partir de las herramientas diagnósticas:


1. Ileo-colonoscopia o rectosigmoidoscopia
2. Biopsia intestinal

Se observó una ventana de un año entre la realización de la prueba y la confirmación del diagnóstico.


RESULTADOS



Incidencia validada a partir de: ileo-colonoscopia o rectosigmoidoscopia



Incidencia validada a partir de: ileo-colonoscopia o rectosigmoidoscopia + biopsia intestinal



CONCLUSIÓN

Con la implementación de la metodología propuesta es posible describir el comportamiento de la incidencia de la colitis ulcerativa.

RIPS: Registro Individual de Prestación de Servicios
 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
 CUPS: Clasificación Única de Procedimientos en Salud
 CIE-10: Clasificación Internacional de Enfermedades

REFERENCIA: 1. Hernandez C. Cols. Diagnóstico y manejo de colitis ulcerosa grave. Una mirada actualizada. Rev Med Chile 2017; 145: 96-105